

لوکین® لوتیراستام

قرص روکش دار خطدار ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ میلی گرم

قبل از شروع مصرف دارو مطالب بروشور را به دقت مطالعه کنید.
این دارو برای شخص شما تجویز شده است. از توصیه کردن آن به دیگران خودداری کنید حتی اگر علائم بیماری افراد دیگر با شما یکسان باشد.
اگر در مورد این دارو سوال‌های بیشتری داشتید از پزشک یا داروساز خود بپرسید.
اگر هر کدام از عوارض جانبی ذکر شده در بروشور، شدید شد به داروساز یا پزشک خود اطلاع دهید.

۱. لوکین® چیست و در چه مواردی قابل استفاده است؟

قرص لوکین® حاوی ماده موثره دارویی به نام لوتیراستام است. این فرآورده برای درمان انواع صرع پارشیال با یا بدون جنرالیزاسیون ثانویه در بیماران با سن بیشتر از ۱۶ سال که به تازگی تشخیص داده شده، به تنهایی تجویز می‌شود.
همچنین ممکن است به رژیم درمانی بیماران تحت درمان با سایر داروهای ضد صرع در موارد زیر، افزوده شود:
- صرع پارشیال با یا بدون جنرالیزاسیون ثانویه (بغیر از در نوزادان زیر یک ماه)
- صرع میوکلونیک در افراد ۱۲ ساله و بزرگتر مبتلا به صرع میوکلونیک جوانان.
- حملات تونیک - کلونیک جنرالیزه اولیه در بیماران ۱۲ ساله و بزرگتر مبتلا به صرع جنرالیزه ایدیوپاتیک.

۲. نکاتی که قبل از مصرف لوتیراستام باید بدانید:

موارد منع مصرف:

- حساسیت به لوتیراستام و یا سایر ترکیبات به کار رفته در فرمولاسیون.

موارد احتیاط:

موارد زیر را پیش از مصرف به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید:

- نارسایی عملکرد کلیه. ممکن است تنظیم دوز نیاز باشد.

- افزایش شدت بیماری (برای مثال افزایش تعداد حملات) به خصوص در ماه اول مصرف و یا زمان افزایش دوز دارو
- در صورت بروز علائم افسردگی و یا افکار آسیب به خود
- سابقه‌ی خانوادگی اختلال در ریتم قلبی یا سابقه‌ی بیماری که شما را مستعد ریتم قلبی نامنظم می‌کند.
- افکار غیر معمول، تحریک پذیری، رفتار پرخاشگرانه، و تغییر خلقی و رفتاری

مصرف لوتیراستام همراه با سایر داروها:

از داروهای نسخه‌ای، بدون نسخه، مکمل‌ها و ترکیبات گیاهی که در حال حاضر مصرف می‌کنید و یا اخیراً مصرف کرده‌اید، لیستی تهیه کنید و به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

بارداری و شیردهی:

لوتیراستام نباید در دوران بارداری مصرف شود مگر اینکه مصرف آن کاملاً ضروری و تحت نظر پزشک باشد.

شیردهی ضمن درمان با این دارو توصیه نشده است.

رانندگی و کار با ماشین آلات:

احتمال بروز احساس خواب‌آلودگی و گیجی همراه با این فرآورده دارویی وجود دارد لذا هنگام رانندگی و کار با ماشین‌آلات، احتیاط نمایید. احتمال بروز خواب‌آلودگی و گیجی در شروع مصرف دارو و پس از هر بار افزایش مقدار دوز دارو بیشتر می‌شود لذا تا زمانی که از دقت و توانایی کامل خود در انجام رانندگی و کار با ماشین‌آلات اطمینان حاصل نکرده‌اید، از انجام این فعالیت‌ها خودداری کنید.

۳. نحوه و مقدار مصرف لوتیراستام:

نحوه‌ی مصرف:

دارو را مطابق با دستور پزشک یا داروساز مصرف نمایید و از کاهش و یا افزایش میزان مصرف و یا طول دوره درمان بدون مشورت با پزشک یا داروساز خودداری نمایید. رعایت این اصول منجر به دستیابی به بهترین نتایج درمانی و کاهش عوارض جانبی دارو می‌گردد.

- مقدار دوز معمولاً به صورت دو دوز منقسم روزانه، صبح و شب در ساعات مشخص از راه خوراکی تجویز می‌شود.

- لوتیراستام را می‌توان همراه غذا یا با معده خالی مصرف نمود.

- قرص‌ها را به صورت کامل با مقدار کافی آب ببلعید و از جویدن یا خرد کردن آن خودداری فرمایید.

در صورتی که لوتیراستام را بیش از مقدار توصیه شده مصرف کردید:

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده، بلافاصله با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

در صورتی که یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید:

اگر با فاصله کوتاهی از برنامه زمانی تعیین شده به یاد آوردید که دارو را مصرف نکرده‌اید، مقدار دوز معمول را بلافاصله میل کنید و سپس برنامه‌ی قبلی را ادامه دهید. برای جبران نوبت فراموش شده مقدار دوز را دو برابر نکنید. اگر یک نوبت یا بیشتر، از مصرف دارو را فراموش کرده‌اید، بلافاصله با پزشک تماس بگیرید.

در صورتی که مصرف لوتیراستام را متوقف کرده‌اید:

هرگز بدون مشورت با پزشک مصرف دارو را متوقف نکنید. در صورتی که طبق صلاح‌دید پزشک نیاز به توقف مصرف دارو باشد، این کار می‌باید به صورت تدریجی صورت گیرد تا از بازگشت حملات تشنجی جلوگیری شود.

۴. عوارض جانبی احتمالی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض

ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.
 در صورت بروز عوارض زیر در اسرع وقت با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
 - سردرد، سرگیجه، سختی در تنفس و علائم حساسیت شدید
 - واکنش دارویی به همراه انوزینوفیلی و علائم گسترده که می‌تواند با علائم شبه آنفلوآنزا، بثورات پوستی، تب، افزایش آنزیم‌های کبدی، تغییرات در سلول‌های خونی و بزرگ شدن غدد لنفاوی بروز یابد.
 - کاهش حجم ادرار به همراه خستگی، تهوع و استفراغ، گیجی، تورم بدن به خصوص تورم پاها و قوزک پا (علائم مرتبط با نارسایی کلیه)
 - قرمزی پوست با اشکال متفاوت، نکرور پوستی سمی (واکنش‌های شدید پوستی) که با بثورات پوستی و تاول تظاهر یافته و سپس لایه‌ی شاخی پوست جدا می‌گردد.
 - انسفالوپاتی که همراه با علائم تغییر خلق، گیجی، خواب‌آلودگی اختلال حافظه و رفتارهای غیرطبیعی تظاهر می‌یابد.

سایر عوارض جانبی:

عوارض بسیار شایع (بیش از ۱۰٪):

نازوفارنژیت (التهاب مخاط حلق و بینی)، خواب‌آلودگی و سردرد

عوارض شایع (۱٪ تا ۱۰٪):

بی‌اشتهایی، بد خلقی، پرخاشگری، اضطراب، بی‌خوابی، عصبی بودن و تحریک پذیری، اختلال تعادل، تشنج، گیجی، کاهش سطح انرژی، لرزش، سرگیجه، سرفه، درد شکمی، اسهال، سوء هاضمه، تهوع، بثورات پوستی، خستگی

عوارض غیر شایع (۰/۱٪ تا ۱٪):

کاهش پلاکت‌ها، کاهش تعداد گلبول‌های سفید، کاهش یا افزایش وزن، افکار و یا وسوسه خودکشی، اختلالات روحی، رفتار غیر معمول، توهم، عصبانیت، گیجی، حملات پانیک، نوسانات خلقی، تحریک‌پذیری، اختلال حافظه، فراموشی، سوزن سوزن شدن، ناهماهنگی حرکات، عدم تمرکز، دوبینی، تاری دید، اختلال در تست‌های ارزیابی عملکرد کبدی، ریزش مو، آگزما، خارش، ضعف عضلانی، درد عضلات
 تمام عوارض دارویی ذکر نشده است و در صورت مشاهده هر عارضه دیگری حتماً با پزشک یا داروساز مشورت شود

۵. شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری کنید.
- دارو را در بسته بندی اصلی، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.
- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.
- بعد از گذشتن تاریخ مصرف دارو، باقی‌مانده دارو را دور بریزید.

منابع:

<https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/26123>