

ویگاسپ®

ویگاباترین

قرص روکش دار ۵۰۰ میلی گرم

قبل از شروع مصرف دارو مطالب برگه راهنما را به دقت مطالعه کنید.

این دارو برای شخص شما تجویز شده است. از توصیه کردن آن به دیگران خودداری کنید؛ حتی اگر علائم بیماری افراد دیگر با شما یکسان باشد.

اگر در مورد این دارو سوال‌های بیشتری داشتید از پزشک یا داروساز خود بپرسید.

در صورت بروز هر یک از عوارض جانبی به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

۱. ویگاسپ® چیست و برای چه مواردی مصرف می‌شود؟

این فرآورده حاوی ماده موثره ویگاباترین بوده و برای کمک به کنترل اشکال مختلف صرع استفاده می‌شود. این دارو همراه با داروهای فعلی شما استفاده می‌شود. این فرآورده دارویی در ابتدا توسط متخصص تجویز می‌شود. پاسخ شما به درمان تحت نظر خواهد بود. این دارو همچنین برای کنترل اسپاسم نوزادان (سندرم وست) نیز استفاده می‌شود.

۲. اطلاعاتی که لازم است قبل از شروع مصرف ویگاسپ® بدانید:

موارد منع مصرف

حساسیت به ویگاباترین یا هر یک از ترکیبات به کار رفته در این فرآورده

هشدارها و موارد احتیاط

در صورت داشتن هر یک از شرایط زیر، قبل از مصرف ویگابترین با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

- اگر در دوران شیردهی هستید

- باردار هستید یا قصد بارداری دارید

- سابقه ابتلا به افسردگی یا هر بیماری روانپزشکی دیگر در گذشته یا حال

- سابقه هر گونه مشکل کلیوی

- سابقه مشکلات چشمی

- کاهش میدان دید (کاهش بینایی از لبه‌های میدان دید) ممکن است حین درمان با ویگابترین رخ دهد. کاهش میدان دید می‌تواند شدید (تا دید تونلی و حتی از دست رفتن بینایی) و برگشت ناپذیر باشد. بسیار حائز اهمیت است که در صورت بروز هرگونه تغییر در بینایی پزشک خود را مطلع کنید. پزشک پیش از شروع درمان با ویگابترین و حین درمان به طور مرتب معاینات میدان دید و حدت بینایی را انجام خواهد داد.

ویگابترین ممکن است با ایجاد اختلالات شبکیه، تاری دید، آتروفی اپتیک، یا التهاب عصب بینایی منجر به کاهش بینایی شود. در صورت بروز اختلالات بینایی، با چشم پزشک مشورت فرمایید.

توجه داشته باشید:

اگر علائمی مانند خواب‌آلودگی، کاهش هوشیاری و حرکات (بهت‌زدگی) یا گیجی در شما ایجاد شد، با پزشک خود مشورت کنید که در مورد کاهش دوز یا قطع مصرف تصمیم گیرد.

تعداد کمی از افرادی که تحت درمان با داروهای ضدصرع مانند ویگابترین هستند، به فکر آسیب رساندن به خود یا خودکشی بوده‌اند. در صورتی که چنین افکاری داشتید، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید.

مصرف ویگاسپ® همراه با سایر داروها

در صورت مصرف کلونازپام به پزشک خود اطلاع دهید، زیرا مصرف همزمان با ویگابترین می‌تواند خطر آرام بخشی را افزایش دهد. اگر داروی دیگری مصرف می‌کنید، اخیراً مصرف کرده‌اید یا ممکن است مصرف کنید لطفاً به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. ویگابترین نباید در ترکیب با سایر داروهایی که ممکن است عوارض جانبی مربوط به چشم داشته باشند استفاده شود.

بارداری و شیردهی

اگر باردار هستید یا قصد بارداری دارید، قبل از مصرف این دارو

از پزشک خود مشورت کنید. در دوران بارداری ویگابترین را مصرف نکنید مگر اینکه پزشک برای شما تجویز کند. ویگابترین ممکن است برای جنین مشکلاتی ایجاد کند. با این حال، مصرف دارو را به طور ناگهانی قطع نکنید زیرا ممکن است سلامت مادر و همچنین سلامت کودک را به خطر بیندازد. ویگابترین به شیر مادر منتقل می‌شود. اگر به نوزاد خود شیر می‌دهید، قبل از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت کنید. در طول درمان نباید شیردهی انجام شود.

رانندگی و کار با ماشین‌آلات

اگر صرع شما کنترل نشده است رانندگی نکنید و با ماشین‌آلات کار نکنید. ویگابترین گاهی اوقات باعث علائمی مانند خواب‌آلودگی یا سرگیجه می‌شود و توانایی شما برای تمرکز و واکنش ممکن است کاهش یابد. اگر چنین علائمی هنگام مصرف ویگابترین رخ دهد، نباید کارهای پرخطری مانند رانندگی یا کار با ماشین‌آلات انجام دهید. اختلالات بینایی که می‌تواند بر توانایی شما در رانندگی و استفاده از ماشین‌آلات تأثیر بگذارد، در برخی از بیمارانی که این دارو را مصرف می‌کنند، مشاهده شده است. اگر می‌خواهید به رانندگی ادامه دهید، باید به طور منظم (هر شش ماه یکبار) از نظر وجود اختلالات بینایی آزمایش شوید، حتی اگر هیچ تغییری در بینایی خود مشاهده نکنید.

۳. نحوه و مقدار مصرف

نحوه‌ی مصرف

همیشه این دارو را دقیقاً همانطور که پزشک یا داروساز برای شما تجویز کرده‌اند مصرف کنید. اگر مطمئن نیستید با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. هرگز دوز مصرفی را بدون مشورت با پزشک تغییر ندهید.

راه مصرف این فراورده به صورت خوراکی است. همیشه قرص را با حداقل یک لیوان آب ببلعید. می‌توانید ویگابترین را قبل یا بعد از غذا مصرف کنید. دوز روزانه را می‌توان به صورت یک دوز مصرف کرد یا به دو دوز تقسیم کرد.

مصرف در کودکان

اختلالات حرکتی و ناهنجاری‌هایی در تصویربرداری با تشدید مغناطیسی (MRI) در اسکن‌های مغزی در نوزادانی که برای اسپاسم نوزادی (سندرم وست) درمان شده‌اند، دیده شده است. اگر اختلالات حرکتی غیرمعمول در کودک مشاهده کردید، با پزشک خود مشورت کنید تا تصمیم بگیرد که آیا

تغییر درمان ضروری است یا خیر.

در صورتی که ویگاسپ® را بیش از مقدار توصیه شده دریافت کردید:

اگر به طور تصادفی قرص‌های ویگابترین بیش از مقدار توصیه شده مصرف کردید، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید یا به نزدیکترین بیمارستان یا مرکز اطلاعات سموم مراجعه نمایید. علائم احتمالی مصرف بیش از حد شامل خواب آلودگی یا کاهش سطح هوشیاری است.

در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید.
اگر مصرف یک نوبت را فراموش کردید، به محض یادآوری آن را مصرف کنید. اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، فقط یک نوبت مصرف کنید. برای جبران دوز فراموش شده دوز دو برابر مصرف نکنید.

۴. عوارض جانبی احتمالی

مانند همه داروها، این دارو نیز می‌تواند عوارض جانبی ایجاد کند، اگرچه همه افراد دچار آن نمی‌شوند. مانند سایر داروهای ضدصرع، برخی از بیماران ممکن است در حین مصرف این دارو، افزایش تعداد تشنج را تجربه کنند. در صورتی که این اتفاق برای شما یا فرزندتان رخ داد، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید.

عوارض جانبی بسیار شایع (بیش از ۱۰٪)

تغییرات میدان بینایی: شدت نقص میدان بینایی می‌تواند خفیف تا شدید متغیر باشد و معمولاً پس از ماه‌ها یا سال‌ها درمان با ویگابترین تشخیص داده می‌شود. تغییرات در میدان بینایی ممکن است برگشت ناپذیر باشد، بنابراین باید تشخیص سریعتر داده شود. در صورت بروز اختلالات بینایی، بلافاصله با پزشک یا بیمارستان تماس بگیرید.

خستگی و خواب‌آلودگی شدید

درد مفاصل

عوارض جانبی شایع (۱٪ تا ۱۰٪)

سردرد، افزایش وزن، لرزش، تورم (ادم)، سرگیجه، بی‌حسی و احساس گزگز یا سوزن سوزن شدن، اختلال تمرکز و حافظه، اختلالات روانی شامل بی‌قراری، پرخاشگری، تحریک‌پذیری، افسردگی، بدگمانی، و بی‌خوابی؛ تهوع، استفراغ و درد شکم، تاری دید، دوبینی، حرکات غیرارادی چشم، اختلال گفتار، کم‌خونی، ریزش مو و آلوپسی

عوارض جانبی غیرشایع (۱/۱۰٪ تا ۱٪)

عدم هماهنگی حرکات، تغییر خلق و خو، رفتار غیرطبیعی،
روان پریشی و راش پوستی

۵. شرایط نگهداری

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری کنید.
- دارو را دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.
- از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

منابع:

<https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.14630.pdf>

Revision Number:06

RONAK

Manufactured by
Ronak Co., Saveh, Iran



RonaCare

021-91009242
Sat. to Wed. 9 A.M. to 5 P.M.