

دکارلین®

تریپتورلین استات ۱/۰ میلی گرم در میلی لیتر
محلول تزریقی

قبل از مصرف برگه راهنما دارو را مطالعه کنید.

این دارو فقط برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران خودداری فرمایید.

از قطع خودسرانه دارو جدا اجتناب فرمایید.

هر ویال (۱ میلی لیتر) حاوی ۱۰۰ میکروگرم تریپتورلین استات، معادل ۹۵/۶ میکروگرم تریپتورلین می باشد.

دکارلین® چیست و در چه مواردی قابل استفاده است؟

دکارلین حاوی ماده موثره تریپتورلین استات می باشد که یک دکاپتید مصنوعی است. این دارو متعلق به گروهی از داروها به نام آگونیست های هورمون آزادکننده گنادوتروپین (GnRH) است و باعث تاثیر بر هورمون های جنسی می شود. این دارو باعث کاهش فعالیت و پیشگیری از افزایش ناگهانی هورمون لوتئینیزه کننده (LH) در خانم هایی که از روش افزایش تحریک کنترل شده تخمدان ها در راه های کمک کننده بارداری استفاده می کنند، می شود.

۱. منع و احتیاطات مصرف

موارد منع مصرف

- حساسیت به ماده موثره تریپتورلین یا سایر مواد جانبی به کار رفته در فرآورده
- حساسیت به سایر آنالوگ های آزادکننده گنادوتروپین
- بارداری و شیردهی
- احتیاطات مصرف
- به دلیل افزایش احتمال ابتلا به پوکی استخوان و شکستگی در بزرگسالان، به ویژه در صورت وجود عوامل خطر ساز زیر با احتیاط مصرف گردد:
- مصرف مقدار زیاد الکل، مصرف زیاد سیگار و مصرف طولانی مدت داروهای ضدصرع (مانند فنی توئین، کاربامازپین و والپروات) یا استروئیدها (مانند پردنیزولون)
- در صورت سابقه تشنج یا ابتلا به سایر بیماری ها یا مصرف همزمان با داروهایی که احتمال بروز تشنج را بیشتر می کنند، با احتیاط مصرف گردد.
- در صورت بروز یا بدتر شدن علائم روانی مثل بی قراری شدید، تحریک پذیری، پر خاشگری، بی حوصلگی و حساسیت بیش از حد، به پزشک خود اطلاع دهید.
- در صورت ابتلا به سردرد ناگهانی، استفراغ، اختلالات بینایی، تغییر وضعیت

روحي و يا گرفتگی قلبي عروقي از يك ساعت بعد از شروع دارو تا دو هفته، فوراً از مراکز درمانی كمك بگيريد.

- اگر به نارسايی متوسط تا شديد كبدی مبتلا هستيد به پزشك خود اطلاع دهيد.
- در صورت بروز علائمی مثل خارش، راش پوستی و تب بعد از تزريق دارو به پزشك خود اطلاع دهيد.
- اگر در طی ۲۴ ساعت اوليه بعد از تزريق دچار علائم زیر شديد، فوراً به پزشك خود اطلاع دهيد، اين علائم ممكن است طی ۷ تا ۱۰ روز بعد شديدتر شوند:
- دردهای شکمی، بزرگ شدن ناحیه شکمی، تهوع و استفراغ يا اسهال. در موارد شديد: بی‌اداری يا كم اداری، تنگی‌نفس و افت فشار خون
- هيپرگلیسمی(افزايش قند خون) و افزايش خطر ابتلا به ديابت در درمان با تريپتورلین استات گزارش شده است. در صورت لزوم، سطح قند خون و هموگلوبين گلیکوزيله (HbA1c) را كنترل كنيد.
- در صورت ابتلا به اختلالات قلبي عروقي به پزشك خود اطلاع دهيد.
- مصرف اين دارو می‌تواند با خطر بارداری خارج رحمی، بارداری چند قلویی و يا سقط جنين همراه باشد.

۲. تداخلات دارویی

توصيه می‌شود قبل از استفاده از دکارلین®، ساير داروهای مصرفی خود را جهت جلوگیری از تداخل دارویی احتمالی با پزشك يا داروساز در میان بگذاريد. از داروهای نسخه‌ای، بدون نسخه، مکمل‌ها و ترکیبات گیاهی که در حال حاضر و يا اخیراً مصرف کرده‌ايد، لیستی تهیه كنيد و به پزشك يا داروساز خود اطلاع دهيد. دکارلین و داروهای زیر می‌توانند اثربخشی يکديگر را تحت تاثیر قرار دهند:

- داروهای ضدآريتمی (آمیودارون، سوتالول، دوفتيليد...)
- سيتالوپرام و اس سيتالوپرام
- داروهای آنتی‌سايکوز (تيوريدازين، كلپرومازين، كلوزاپين...)
- پيموزايد و موکسی فلوکساسين
- داروهای ضدديابت

۳. تنظيم دوز دارو

دارو را دقيقاً مطابق دستور پزشك مصرف نماييد. اين دارو معمولاً به صورت روزانه بک بار تزريق زیرجلدی در قسمت پایینی شکم، در روزهای مشخص تجویز می‌گردد. هنگامی که تحت درمان با دکارلین هستيد، پزشك شما به طور معمول در فواصل مشخص اسکن سونوگرافي و آزمایش خون برای نظارت بر پاسخ شما به درمان انجام می‌دهد.

نارسايی کلیوی:

در نارسايی کلیوی نیاز به تنظيم دوز دارو نیست.

نارسايی کبدی:

در نارسايی کبدی نیاز به تنظيم دوز دارو نیست.

۴. نحوه تزريق دارو

تجویز اين دارو بايد تحت نظر پزشك انجام شود.

دکارلین محلول آماده تزريق بوده و نیازی به آماده‌سازی ندارد.

این دارو به صورت زیرجلدی و یکبار در روز در قسمت پایینی شکم تزريق می‌شود. پس از اولین تزريق بیمار بايد برای بررسی واکنش‌های حساسیتی برای مدت ۳۰ دقیقه در بیمارستان تحت نظر باشد اما در صورت مهارت و آگاهی کافی، دوزهای بعدی را خود بیمار می‌تواند تزريق کند. به منظور پیشگیری از تحلیل بافت چربی زیرجلدی، بايد در هر سری تزريق، محل تزريق را با مشورت پزشك عوض کرد و در ناحیه‌ای متفاوت از اطراف شکم دارو را تزريق نمود.

۱. ابتدا دست‌ها و محل تزریق را با آب و صابون شسته و خشک نمایید.
۲. به نحو مناسبی بر روی تخت و یا صندلی قرار بگیرید، به نحوی که به محل تزریق تسلط کافی داشته باشید.
۳. محل تزریق را بر روی شکم و به فاصله حداقل ۵ سانتی‌متری از ناف تعیین نمایید.
- توجه: از تزریق دارو در فاصله کمتر از ۵ سانتی‌متری از ناف و یا در محل زخم و یا سایر ضایعات پوستی خودداری فرمایید.
۴. سرپوش ویال را برداشته، سوزن سرنگ را وارد ویال نموده و محتویات داخل ویال را به درون سرنگ بکشید، از آلوده شدن سر سرنگ بپرهیزید.
۵. محل تزریق را بین انگشتان اشاره و شست بگیرید، به گونه‌ای که برآمدگی مناسب جهت تزریق ایجاد شود. (در افراد با وزن بالا نیازی نیست).
۶. حباب ایجاد شده در سر سرنگ را با دقت خالی نموده، سرنگ را به صورت عمود (۹۰ درجه) در دست گرفته و به برآمدگی ایجاد شده تزریق نمایید.
- توجه کنید کل طول سوزن وارد موضع تزریق شود. (در افراد لاغر ۴۵ درجه)
۷. پیستون سرنگ را با انگشت شست بفشارید تا محتویات آن وارد بافت زیر پوستی شود. در حین تزریق موضع مورد نظر را رها نکنید.
۸. بعد از اتمام تزریق، سرنگ را از موضع خارج کنید و سرپوش را بر روی سرنگ قرار داده و آن را دور بیندازید.
۹. سرنگ، سوزن و ویال تنها برای یک بار مصرف می‌باشند. پس از استفاده، آن‌ها را به روش مناسب دور بریزید.

۵. در صورت فراموش کردن یک نوبت دارو

در صورت فراموشی یک نوبت، به پزشک خود اطلاع دهید. از دوبرابر کردن مقدار مصرف اجتناب کنید.

۶. در صورتی که دکارلین® را بیش از مقدار تجویز شده دریافت کردید:

در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده، حتماً با پزشک یا داروساز مشورت فرمایید.

۷. بارداری شیردهی

این دارو در دوران بارداری منع مصرف دارد.
مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

۸. عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه این عوارض در همه افراد دیده نمی‌شود.
در صورت بروز یا تشدید هر یک از عوارض جانبی زیر، به پزشک خود اطلاع دهید.

عوارض جانبی جدی

سندرم تحریک بیش از حد تخمدان (OHSS)، این سندرم در افراد مبتلا به تخمدان پلی کیستیک شایع‌تر است، در موارد شدید این سندرم علائم زیر مشاهده می‌شوند:

درد شکمی، بزرگ شدن شدید تخمدان، افزایش وزن، تنگی نفس، کاهش ادرار، و نشانه‌های گوارشی شامل تهوع، استفراغ و اسهال

عوارض جانبی با شیوع بیشتر

سر درد، تهوع، استفراغ، واکنش‌های محل تزریق مانند قرمزی یا درد و تورم

محل تزریق درد شکمی، خونریزی واژینال، خستگی

علائم شبه آنفولانزا، تغییرات حالات روحی یا اضطراب

عوارض جانبی با شیوع کمتر

گرگرفتگی، درد هنگام رابطه جنسی، کیست تخمدان، درد ناحیه لگن، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، فارنژیت، سرگیجه، تورم شکم، کمردرد، سقط جنین،

درد در دوران قاعدگی

این موارد، تمامی عوارض دارو نیست، در صورت مشاهده این عوارض یا عوارض دیگر با پزشک یا داروساز خود صحبت کنید.

۹. نحوه نگهداری دارو

- دارو در یخچال (دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد)، درون جعبه اصلی، دور از نور نگهداری و از یخ‌زدگی محافظت نمایید.
- فراورده شفاف و بی‌رنگ است. در صورت مشاهده کدورت، ذره یا تغییر رنگ از مصرف آن خودداری نمایید.
- دارو دور از دید و دسترس اطفال نگهداری شود.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

منابع:

1. <https://www.ferring.ca/media/1016/decapeptyl-pm-english.pdf>
2. UpToDate, Triptorelin monograph
3. Drugs.com/Triptorelin interactions: <https://www.drugs.com/drug-interactions/triptorelin-index.html?filter=3>

RONAK

Manufactured by
Ronak Co., Saveh, Iran



RonaCare

021-91009242
Sat. to Wed. 9 A.M. to 5 P.M.