

تگزانیک®

ترانگزامیک اسید

کپسول ۲۵۰ میلی گرم

قبل از شروع مصرف دارو مطالب بروشور را به دقت مطالعه کنید.

این دارو فقط برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. بنابراین از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری فرمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفاً با پزشک معالج و یا داروساز خود تماس حاصل فرمایید.

در صورت تشدید عوارض جانبی و یا داشتن هرگونه عارضه جانبی که در این برگه راهنما ذکر نشده لطفاً با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

۱. تگزانیک چیست و در چه مواردی قابل استفاده است؟

این فرآورده حاوی ماده مؤثره‌ی ترانگزامیک اسید می‌باشد. ترانگزامیک اسید متعلق به گروه داروهای ضد فیبرینولیتیک است. این داروها برای توقف و یا کاهش خونریزی ناخواسته استفاده می‌شوند. هنگام خونریزی، بدن لخته‌هایی تشکیل می‌دهد تا خونریزی را متوقف کند. در برخی از افراد این لخته‌ها شکسته شده و باعث خونریزی بیش از حد می‌شوند. ترانگزامیک اسید حل شدن این لخته‌ها را متوقف کرده و خونریزی ناخواسته را کاهش می‌دهد. این دارو برای جلوگیری یا کاهش خونریزی برای مدت کوتاه در شرایط مختلف استفاده می‌شود که ممکن است برای یکی از موارد زیر برای شما تجویز شده باشد:

- پس از جراحی پروستات
- پس از جراحی مثانه
- عادت‌های ماهانه با خونریزی شدید
- خونریزی بینی
- جراحی دهانه رحم
- خونریزی داخل چشم
- جراحی دندان در بیماران هموفیلی (افرادی که راحت‌تر از حالت عادی خونریزی

می‌کنند)

- بیماری ارثی ادم آنژیونورتیک

۲. نکاتی که باید قبل از مصرف داروی ترانگزامیک اسید بدانید:

موارد منع مصرف

- حساسیت به ترانگزامیک اسید یا هر یک از ترکیبات دیگر این فرآورده

- مشکلات جدی کلیوی (نارسایی کلیه)

- سابقه لخته خون در رگ‌های خونی (ترومبوز)

- ابتلا به انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC)، بیماری‌ای که در آن خون شروع

به لخته شدن در سراسر بدن می‌کند.

- سابقه تشنج

در صورت وجود هر یک از موارد فوق، با پزشک خود صحبت کنید.

موارد احتیاط

موارد زیر را پیش از شروع مصرف ترانگزامیک اسید به پزشک یا داروساز

خود اطلاع دهید:

- وجود خون در ادرار

- سابقه خونریزی غیرقابل کنترل

- انعقاد داخل عروقی منتشر (DIC)

- برای مدت طولانی برای درمان بیماری ارثی ادم آنژیونورتیک دارو مصرف

می‌کنید. در این صورت، ممکن است لازم باشد به طور منظم آزمایش‌های

چشمی و آزمایش خون انجام دهید تا بررسی شود که کبد شما عملکرد

مناسبی دارد.

- عادت‌های ماهانه نامنظم دارید

- سابقه لخته شدن خون در رگ‌های خونی (ترومبوز) دارید

- فردی در خانواده شما سابقه‌ی لخته شدن خون در رگ‌های خونی دارد

- بیماری کلیوی دارید

- از داروهای ضد بارداری خوراکی استفاده کرده‌اید

مصرف ترانگزامیک اسید همراه با سایر داروها

اگر داروهای دیگر از جمله داروهای بدون نسخه مصرف می‌کنید، اخیراً

مصرف کرده‌اید یا ممکن است مصرف کنید، به پزشک خود اطلاع دهید.

ترانگزامیک اسید از عملکرد داروهای فیبرینولیتیک (مانند استرپتوکیناز) که

برای کمک به حل شدن لخته‌های خون استفاده می‌شوند جلوگیری می‌کند.

بارداری و شیردهی

اگر باردار یا در دوران شیردهی هستید، احتمال می‌دهید باردار باشید یا

قصد بارداری دارید، قبل از مصرف این دارو از پزشک یا داروساز خود

راهنمایی بخواهید.

استفاده در کودکان

پزشک دوز را با توجه به وزن کودک شما تعیین کرده و دقیقاً به شما

خواهد گفت که چه مقدار دارو باید به کودک خود بدهید.

بیماران مبتلا به مشکلات کلیوی

پزشک به شما خواهد گفت که چه مقدار مصرف کنید. دوزی که در این

شرایط مصرف می‌کنید ممکن است کمتر از دوز معمول بزرگسالان باشد.

۳. نحوه و مقدار مصرف ترانگزامیک اسید

نحوه مصرف

همیشه این دارو را دقیقاً همانطور که پزشک به شما گفته است مصرف کنید.

به یاد داشته باشید داروی شما باید همیشه با یک لیوان آب با یا بدون غذا مصرف شود. کپسول باید به طور کامل بلعیده شود. از شکستن و جویدن کپسول پرهیز نمایید.

در صورتی که ترانگزامیک اسید را بیش از مقدار توصیه شده دریافت کردید:

اگر تصادفاً مقدار زیادی از داروی خود را مصرف کرده‌اید، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید یا به نزدیک‌ترین بیمارستان بروید. مصرف بیش از حد ترانگزامیک اسید ممکن است باعث ایجاد تهوع، استفراغ، سرگیجه و یا سبکی سر در هنگام ایستادن شود.

در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید:

برای جبران دوز فراموش شده دو دوز مصرف نکنید. دوز بعدی را طبق برنامه مصرف کنید. اگر سؤال دیگری در مورد استفاده از این دارو دارید، از پزشک یا داروساز خود بپرسید.

۴. عوارض جانبی احتمالی

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته شود، اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

در صورت مشاهده هر یک از علائم زیر مصرف این دارو را قطع کرده و بلافاصله به بیمارستان مراجعه کنید:

- درد یا احساس سنگینی در قفسه سینه

- تنگی نفس ناگهانی

- سرفه خونی

- درد یا تورم غیرعادی در بازوها یا پاها

- بیهوش شدن

ممکن است لخته خون در پا یا ریه ایجاد شده باشد.

در صورت مشاهده هر یک از علائم نادر زیر، مصرف این دارو را متوقف کنید و فوراً به پزشک خود اطلاع دهید:

- مشکلات بینایی، به خصوص مشکل در دیدن رنگ‌ها

- ایجاد لخته خون در چشم. این اتفاق ممکن است باعث خونریزی در چشم یا از دست دادن بینایی شود.

- واکنش آلرژیک (علائم خفیف مانند خارش و/یا بثورات پوستی و علائم شدیدتر مانند تورم صورت، لب‌ها، زبان و/یا گلو با مشکل در بلع یا تنفس).

سایر عوارض جانبی

عوارض جانبی بسیار نادر (کمتر از ۰/۰۱٪)

حالت تهوع و استفراغ، اسهال. در صورت بروز، به پزشک خود اطلاع دهید.

۵. شرایط نگهداری:

- دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- داروی منقضی شده را استفاده نکنید.
- دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.
- دارو را در بسته‌بندی اصلی و به دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

منابع:

<https://www.medicines.org.uk/emc/product/2359/pil>

Revision Number:02

RONAK

Manufactured by
Ronak Co., Saveh, Iran



RonaCare

021-91009242
Sat. to Wed. 9 A.M. to 5 P.M.