

وکسیرل®

فلووکسامین

قرص روکش دار ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم

قبل از شروع مصرف دارو مطالب بروشور را به دقت مطالعه کنید. این دارو فقط برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. بنابراین از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری فرمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفاً با پزشک معالج و یا داروساز خود تماس حاصل فرمایید. در صورت تشدید عوارض جانبی و یا داشتن هرگونه عارضه جانبی که در این برگه راهنما ذکر نشده لطفاً با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

۱. وکسیرل چیست و در چه مواردی قابل استفاده است؟

این فرآورده حاوی ماده‌ی موثره‌ی فلووکسامین می‌باشد. این دارو متعلق به گروهی از داروها به نام مهارکنندگان انتخابی بازجذب سروتونین می‌باشد. فلووکسامین در درمان افسردگی و اختلال وسواس موثر است.

۲. نکاتی که باید قبل از مصرف داروی فلووکسامین بدانید

در صورت وجود موارد زیر، فلووکسامین را مصرف نکنید:

- حساسیت به فلووکسامین یا هر یک از اجزای فرآورده

- داروهایی از دسته مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز (MAOI) مصرف می‌کنید که برای درمان افسردگی یا اضطراب تجویز می‌شوند، از جمله لینزولید، آنتی بیوتیکی که یک MAOI نیز هست. درمان با فلووکسامین باید حداقل ۲ هفته پس از قطع یک MAOI برگشت‌ناپذیر شروع شود. با این حال، درمان با فلووکسامین پس از قطع برخی از MAOI‌های برگشت‌پذیر می‌تواند از روز بعد شروع کرد. در موارد استثنایی لینزولید ممکن است همراه با فلووکسامین استفاده شود، مشروط بر اینکه پزشک بتواند شما را از نزدیک تحت نظر داشته باشد. پس از قطع مصرف MAOI، پزشک به شما توصیه می‌کند که چگونه باید مصرف

فلووکسامین را شروع کنید.

- از تیزانیدین استفاده می‌کنید، دارویی که اغلب به عنوان شل‌کننده عضلانی استفاده می‌شود.
- پیموزاید، یک داروی نورولپتیک که برای درمان اسکیزوفرنی و سایر بیماری‌های روانپزشکی استفاده می‌شود، مصرف می‌کنید.
- در دوران شیردهی هستید.

موارد احتیاط

موارد زیر را پیش از شروع مصرف فلووکسامین به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید:

- اخیراً دچار حمله‌ی قلبی شده‌اید
- باردار هستید یا قصد بارداری دارید
- مبتلا به صرع هستید
- سابقه‌ی خونریزی دارید و یا از داروهایی استفاده می‌کنید که به طور معمول ریسک خونریزی را افزایش می‌دهند (نظیر مسکن‌ها)
- مبتلا به دیابت هستید
- در حال دریافت درمان الکتروشوک هستید
- مبتلا به بیماری شیدایی هستید
- مشکلات کبد و کلیه دارید
- مبتلا به گلوکوم (افزایش فشار داخل چشم) هستید
- سن زیر ۱۸ سال دارید

افکار خودکشی و بدتر شدن افسردگی یا اختلال اضطراب

اگر مبتلا به افسردگی هستید و/ یا اختلالات اضطرابی دارید، گاهی اوقات ممکن است به فکر آسیب رساندن به خود یا خودکشی باشید. این افکار ممکن است در اولین شروع مصرف داروهای ضد افسردگی افزایش یابد، زیرا شروع اثربخشی این داروها معمولاً حدود دو هفته به زمان نیاز دارد. اگر شرایط زیر را دارید در معرض ابتلا به این موارد هستید:

- اگر قبلاً در مورد خودکشی یا آسیب رساندن به خود فکر کرده‌اید.
- اگر جوان هستید. اطلاعات به دست آمده از کارآزمایی‌های بالینی نشان می‌دهد که خطر افزایش رفتار خودکشی در بزرگسالان کمتر از ۲۵ سال مبتلا به بیماری‌های روان‌پزشکی که با داروهای ضدافسردگی درمان شده‌اند، افزایش می‌یابد.

در صورت بروز هرگونه افکار یا تجربیات ناراحت کننده بلافاصله با پزشک تماس بگیرید.

مصرف در کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال

کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال نباید از این دارو استفاده کنند، مگر اینکه برای اختلال وسواس فکری-عملی تحت درمان باشند. علت منع مصرف در افراد زیر ۱۸ سال این می‌باشد که هنگام مصرف این نوع دارو، این افراد در معرض خطر عوارض جانبی مانند اقدام به خودکشی، افکار خودکشی و خصومت مانند پرخاشگری، رفتار مخالف و عصبانیت هستند. همچنین تاثیر فلووکسامین بر بلوغ، هوش و رفتار در این گروه سنی نامشخص است.

مصرف فلووکسامین همراه با سایر داروها

اگر داروی دیگری (از جمله داروهایی که بدون نسخه تهیه شده‌اند، فرآورده‌های مکمل، و گیاهی) مصرف می‌کنید، اخیراً مصرف کرده‌اید یا ممکن است مصرف کنید، به پزشک خود اطلاع دهید.

- در زمانی که تحت درمان با فلووکسامین هستید، نباید شروع به مصرف داروی گیاهی گل راعی (علف چای) کنید زیرا ممکن است منجر به افزایش اثرات نامطلوب شود. اگر با شروع مصرف فلووکسامین از قبل گل راعی استفاده می‌کنید، مصرف گل راعی را متوقف کنید و در ویزیت بعدی به پزشک خود اطلاع دهید.

- اگر در دو هفته گذشته، دارویی برای درمان افسردگی یا اضطراب مصرف کرده‌اید یا مبتلا به اسکیزوفرنی هستید، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

همچنین مصرف موارد زیر را به پزشک یا داروساز اطلاع دهید:

- بنزودیازپین‌ها

- ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای مانند نورتریپتیلین، آمیتریپتیلین

- لیتیم

- تریپتوفان

- مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز مانند موکلوبماید

- پیموزاید

- مهارکنندگان اختصاصی بازجذب سروتونین دیگر مانند سیتالوپرام

- آسپرین یا ترکیبات مشابه آسپرین

- سیکلوسپورین

- متادون

- مکسیلتین

- فنی‌توئین

- کاربامازپین

- پروپرانولول

- روپینیرول

- تریپتان‌ها برای درمان میگرن نظیر سوماتریپتان یا زولمیتریپتان

- ترفنادین

- سیلدنافیل

- تنوفیلین

- ترامادول

- کلوپیدوگرل، وارفارین، و سایر داروهای ضدانعقاد

مصرف دارو همراه با غذا و نوشیدنی

- اگر از این دارو استفاده می‌کنید الکل ننوشید. این به این دلیل است که الکل همراه با فلووکسامین باعث خواب آلودگی و بی‌ثباتی شما می‌شود.

- اگر به طور معمول مقدار زیادی چای، قهوه و نوشابه‌های حاوی کافئین مصرف می‌کنید، ممکن است علائمی مانند لرزش دست‌ها، حالت تهوع، ضربان قلب سریع، بی‌قراری و مشکل در خواب (بی‌خوابی) داشته باشید. اگر میزان کافئین مصرفی خود را کاهش دهید، این علائم ممکن است از بین بروند.

بارداری و شیردهی

اطلاعات محدودی در مورد استفاده از فلووکسامین در دوران بارداری وجود دارد. اگر باردار هستید از فلووکسامین استفاده نکنید، مگر اینکه پزشک شما آن را کاملاً ضروری بداند. اگر در حال حاضر فلووکسامین مصرف می‌کنید و قصد دارید باردار شوید، لطفاً با پزشک خود مشورت کنید تا تصمیم بگیرید که آیا داروی جایگزین لازم یا مناسب است یا خیر.

فلووکسامین وارد شیر مادر می‌شود و خطر تأثیر بر روی نوزاد وجود دارد. بنابراین، باید موضوع را با پزشک خود در میان بگذارید، پزشک تصمیم خواهد گرفت که شیردهی یا درمان با فلووکسامین را یا خیر.

رانندگی و کار با ماشین آلات

این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی و گیجی شود بنابراین در صورت تجربه این علائم از رانندگی و کار با ماشین آلات پرهیز نمایید.

۳. نحوه و مقدار مصرف فلووکسامین

نحوه مصرف

همیشه فلووکسامین را همانطور که پزشک به شما گفته است مصرف کنید. اگر مطمئن نیستید باید با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. اگر بعد از چند هفته احساس بهبودی نکردید، با پزشک خود صحبت کنید تا شما را راهنمایی کند. پزشک ممکن است تصمیم بگیرد که دوز را به تدریج افزایش دهد.

اگر پزشک به شما توصیه می‌کند که بیش از ۱۵۰ میلی‌گرم در روز مصرف کنید، همه دوز تجویز شده را یکجا مصرف نکنید. از پزشک خود بپرسید که چه زمان‌هایی باید دارو را مصرف کنید.

قرص‌ها را با آب ببلعید. از جویدن قرص‌ها خودداری کنید.

حتی در صورت احساس بهبودی، بدون مشورت با پزشک مصرف دارو را قطع نکنید. در صورتی که طبق صلاحدید پزشک نیاز به قطع مصرف فلووکسامین باشد، پزشک شما را راهنمایی خواهد کرد تا دوز خود را به آرامی در طی چند هفته یا چند ماه کاهش دهید، که به کاهش احتمال بروز علائم قطع مصرف کمک کند. عوارض قطع مصرف فلووکسامین در اکثر افراد خفیف است و در عرض دو هفته خود به خود از بین می‌رود. برای برخی افراد، این علائم ممکن است شدیدتر باشد یا برای مدت طولانی‌تری ادامه یابد. عوارض قطع مصرف فلووکسامین عبارتند از:

بی‌قراری، اضطراب، گیجی، اسهال، اختلالات خواب، رویاهای غیرمعمول، سرگیجه، بی‌ثباتی عاطفی، سردرد، تحریک پذیری، تهوع، استفراغ، ضربان قلب سریع، حس شوک الکتریکی، اختلالات بینایی، تعریق و لرزش.

در صورتی که فلووکسامین را بیش از مقدار توصیه شده دریافت کردید: در صورت مصرف بیش از حد فلووکسامین توسط شما یا شخصی دیگر، با پزشک صحبت کنید یا فوراً به اورژانس بیمارستان مراجعه کنید. بسته دارو را با خود ببرید. علائم مصرف بیش از حد شامل، تهوع، استفراغ، اسهال و احساس خواب آلودگی یا سرگیجه است. حوادث قلبی (ضربان قلب آهسته یا تند، فشار خون پایین)، مشکلات کبدی، تشنج و کما نیز

گزارش شده است.

در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید:

اگر قرصی را فراموش کردید، تا زمان نوبت بعدی صبر کنید. جهت جبران نوبت فراموش شده، دوز دو برابر مصرف نکنید.

۴. عوارض جانبی احتمالی

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. گاهی اوقات، افکار خودکشی یا آسیب رساندن به خود ممکن است در چند هفته اول درمان با فلووکسامین تا زمانی که اثر ضد افسردگی دارو ایجاد شود، رخ دهد یا افزایش یابد.

اگر چندین علامت از موارد زیر را به طور همزمان دارید، ممکن است یکی از شرایط نادر زیر را داشته باشید:

- سندرم سروتونین: تعریق، سفتی یا اسپاسم عضلانی، عدم تعادل، گیجی، تحریک پذیری یا بی‌قراری شدید

- سندرم نورولپتیک بدخیم: ماهیچه‌های سفت، تب، گیجی و سایر علائم مرتبط

- SIADH: احساس خستگی، ضعف یا گیجی و درد، سفت شدن عضلات یا عضلات کنترل نشده

- واکنش‌های پوستی شدید مانند راش‌های شدید پوستی یا قرمزی، از جمله بثورات، که از اندام‌ها معمولاً در هر دو طرف بدن شروع می‌شود، و تبدیل به دایره‌های متحدالمرکز شبیه به یک هدف می‌شود (اریتم مولتی فرم)، بثورات گسترده با تاول و جدا شدن لایه‌های پوست، به ویژه اطراف دهان، بینی، چشم‌ها و اندام تناسلی (سندرم استیونز-جانسون)، جدا شدن گسترده لایه‌های پوست (بیش از ۳۰ درصد از سطح بدن - نکرولیز اپیدرمی سمی). فراوانی این عوارض ناشناخته است (از روی داده‌های موجود امکان تخمین وجود ندارد).

در صورت بروز موارد فوق، مصرف دارو را متوقف کرده و بلافاصله با پزشک تماس بگیرید.

در صورت مشاهده کبودی غیر معمول یا وجود خون در استفراغ یا مدفوع، با پزشک تماس بگیرید.

قطع مصرف فلووکسامین (به ویژه اگر ناگهانی باشد) به طور شایع به بروز علائم قطع مصرف منجر می‌شود.

گاهی در آغاز درمان حالت تهوع رخ می‌دهد که معمولاً طی چند هفته برطرف می‌گردد.

سایر عوارض جانبی

عوارض شایع (۱٪ تا ۱۰٪)

- بیقراری، اضطراب، یبوست، اسهال، مشکل در خواب، سرگیجه، خشکی دهان، ضربان قلب سریع، احساس خواب آلودگی (بی‌حالی)، احساس ناخوشی، سردرد، سوء هاضمه، از دست دادن اشتها، عصبی بودن، درد معده، تعریق، لرزش، ضعف عضلانی، استفراغ

عوارض غیر شایع (کمتر از ۱٪)

- واکنش‌های پوستی آلرژیک (از جمله تورم صورت، لب یا زبان، بثورات

پوستی یا خارش). گیجی. تاخیر در انزال. سرگیجه شدید هنگام ایستادن
توهم. عدم هماهنگی. درد عضلات یا مفاصل. پرخاشگری

۵. شرایط نگهداری:

- دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- داروی منقضی شده را استفاده نکنید.
- دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری شود.
- دارو را در بسته بندی اصلی و به دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

منابع:

<https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.6603.pdf>

RONAK



RonaCare

Manufactured by
Ronak Co., Saveh, Iran

021-91009242
Sat. to Wed. 9 A.M. to 5 P.M.