

بیسمولیکس®

بیسموت ساب سیترات

قرص خطدار

بیسموت ساب سیترات، معادل ۱۲۰ میلی گرم
بیسموت اکسید

قبل از شروع مصرف دارو مطالب بروشور را به دقت مطالعه کنید.

این دارو فقط برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. بنابراین از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری فرمایید.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفاً با پزشک معالج و یا داروساز خود تماس حاصل فرمایید.

در صورت تشدید عوارض جانبی و یا داشتن هرگونه عارضه جانبی که در این بروشور ذکر نشده لطفاً با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

۱. بیسمولیکس چیست و در چه مواردی قابل استفاده است؟

این فرآورده حاوی ماده موثره دارویی به نام بیسموت ساب سیترات است. این دارو متعلق به گروهی از داروهاست که روی زخم‌های معده و دوازده موثر است. مشتقات بیسموت تشکیل شده در محیط دستگاه گوارش به پروتئین‌های بافت‌های دارای زخم متصل شده و یک لایه محافظ بر روی زخم تشکیل می‌دهد. همچنین این دارو منجر به افزایش ترکیباتی به نام پروستاگلاندین در محل شده که با تحریک ترشح بیکربنات و از معده

محافظت می‌کند. این دارو در ترکیب با داروهای دیگر در زخم معده‌ی ناشی از هلیکوباکتر پیلوری استفاده می‌شود.

۲. نکاتی که باید قبل از مصرف داروی بیسموت ساب‌سیتрат بدانید:

موارد منع مصرف:

- حساسیت به بیسموت ساب‌سیترات و یا سایر ترکیبات به کار رفته در فراورده.

- نارسایی شدید کلیوی

موارد احتیاط:

مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۱۲ سال توصیه نمی‌شود.

موارد زیر را پیش از شروع مصرف به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید:

- ابتلا به مشکلات کلیوی

مصرف بیسموت ساب‌سیترات همراه با سایر داروها:

از داروهای نسخه‌ای، بدون نسخه، مکمل‌ها و ترکیبات گیاهی که در حال حاضر مصرف می‌کنید و یا اخیراً مصرف کرده‌اید، لیستی تهیه کنید و به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

حداقل نیم ساعت قبل و بعد از مصرف هر دوز، از مصرف سایر فرآورده‌های دارویی بدون مشورت با پزشک یا داروساز خودداری فرمایید.

جذب تتراسایکلین در صورت مصرف همزمان با بیسموت ساب‌سیترات کاهش می‌یابد.

مصرف بیسموت ساب‌سیترات همراه با غذاها، نوشیدنی‌ها:

حداقل نیم ساعت قبل و بعد از بیسموت ساب‌سیترات از خوردن و آشامیدن به خصوص مصرف شیر، میوه و یا آب میوه خودداری کنید. چرا که باعث عدم کارایی مناسب دارو می‌شود.

بارداری و شیردهی:

اطلاعات کافی در رابطه با مصرف بیسموت ساب‌سیترات در طول بارداری و شیردهی وجود ندارد، لذا در طول بارداری و شیردهی فقط باید با تجویز و تحت نظر پزشک مصرف گردد.

رانندگی و کار با ماشین‌آلات:

بیسموت ساب‌سیترات اثری روی توانایی شما در کار با ماشین‌آلات یا رانندگی ندارد. اما تا زمانی که اثر دارو بر

شما مشخص نشده، از رانندگی و کار با ماشین‌آلات سنگین خودداری کنید.

۳. نحوه و مقدار مصرف بیسموت ساب‌سیترات: نحوه مصرف:

دارو را مطابق با دستور پزشک یا داروساز همراه با آب مصرف نمایید و از کاهش و یا افزایش میزان مصرف و یا طول دوره درمان بدون مشورت با پزشک یا داروساز خودداری نمایید. رعایت این اصول منجر به دستیابی به بهترین نتایج درمانی و کاهش عوارض جانبی دارو می‌گردد. دارو باید با معده خالی (۳۰ دقیقه تا یک ساعت قبل از هر وعده غذایی) مطابق با دستور پزشک مصرف گردد.

در صورتی که بیسموت ساب‌سیترات را بیش از مقدار توصیه شده مصرف کردید:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، سریعاً به پزشک خود و یا بیمارستان مراجعه نمایید. بسته‌ی دارو را همراه خود داشته باشید.

در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید:
در صورت فراموش نمودن یک نوبت از مصرف دارو به هیچ عنوان دوز را دو برابر نکنید. دوز بعدی را طبق برنامه قبلی استفاده نمایید.

عوارض جانبی احتمالی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. همچنین همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

عوارض با احتمال بروز بیشتر:

تیره شدن رنگ مدفوع، تغییر رنگ زبان

عوارض با احتمال بروز کمتر:

تهوع، استفراغ، یبوست، اسهال، درد معده، سردرد، بثورات پوستی، ضعف و گرفتگی عضلات

۴. شرایط نگهداری:

- دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری شود.
- دارو را دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.
- دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

منابع:

1. <https://www.medicines.org.uk/emc/ingredien>
t/1711/bismuth
2. AHFS 2021/bismuth
3. De-Nol Patient Information Leaflet

Revision Number:04

RONAK

Manufactured by
Ronak Co., Saveh, Iran



RonaCare

021-91009242
Sat. to Wed. 9 A.M. to 5 P.M.