

اس امپیکر®

اس امپرازول

کپسول انتریک کوتد ۲۰ و ۴۰ میلی گرم

قبل از شروع مصرف دارو مطالب بروشور را به دقت مطالعه کنید. این دارو برای شخص شما تجویز شده است. از توصیه کردن آن به دیگران خودداری کنید حتی اگر علائم بیماری افراد دیگر با شما یکسان باشد.

اگر در مورد این دارو سوال‌های بیشتری داشتید از پزشک یا داروساز خود بپرسید.

در صورت تشدید عوارض جانبی و یا داشتن هرگونه عارضه جانبی که در این بروشور ذکر نشده لطفاً با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

۱. اس امپیکر چیست و در چه مواردی قابل استفاده می‌باشد؟
اس امپیکر حاوی ماده موثره متعلق به گروهی از داروها به نام مهارکننده‌های پمپ پروتون است و موجب کاهش مقدار تولید اسید معده می‌شود و در موارد زیر به کار می‌رود:

بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۲ سال:

- ریفلاکس معده به مری: در این بیماری اسید معده به داخل مری بازگشته و موجب درد، تورم و سوزش سر معده می‌شود.

- زخم در معده یا قسمت بالایی روده آلوده به باکتری هلیکوباکتر پیلوری: در صورت بروز این بیماری، پزشک شما ممکن است برای درمان عفونت و بهبود زخم آنتی‌بیوتیک نیز تجویز کند.

بزرگسالان:

زخم معده ناشی از مصرف داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی: در صورت مصرف این دسته دارویی، اس امپرازول می‌تواند برای پیشگیری از زخم معده به کار رود. ترشح بیش از حد اسید معده ناشی از توده پانکراس (سندروم زولینگر-الیسون).

۲. نکاتی که قبل از مصرف اس امپرازول باید بدانید:

در صورت وجود موارد زیر اس امپرازول را مصرف نکنید:

- حساسیت به اس امپرازول، سایر مهارکننده‌های پمپ پروتون (امپرازول، پنتوپرازول، لانسوپرازول، رایپرازول) یا سایر ترکیبات به کار رفته در فراورده
- مصرف داروی نلفیناویر

موارد احتیاط:

در صورت ابتلا به موارد زیر پزشک یا داروساز خود را مطلع کنید:

- مشکل شدید کبدی
- سابقه ابتلا به واکنش پوستی در اثر مصرف داروهای کاهنده اسید معده مثل اس امپرازول
- نیاز به انجام آزمایش خون کروموگرانین A
- ابتلا به راش پوستی، به ویژه در مناطق در معرض آفتاب، در اولین فرصت پزشک خود را مطلع سازید، زیرا ممکن است نیاز به قطع درمان با اس امپرازول داشته باشید.
- هرگونه عارضه دیگر مانند درد مفاصل را ذکر کنید.

اس امپرازول می‌تواند سبب پوشاندن علائم سایر بیماری‌ها شود. لذا در صورت بروز هر یک از علائم زیر، قبل و یا در حین مصرف اس امپرازول، در اسرع وقت، پزشک خود را مطلع کنید:

- از دست دادن وزن به مقدار قابل توجه بدون دلیل
- مشکل یا درد هنگام بلع
- معده درد و یا علائم سوءهاضمه.
- استفراغ محتویات معده یا خون
- مدفوع سیاه (یا به رنگ خون)

اس امپرازول، به ویژه در درمان طولانی مدت (بیش از ۲ سال) ممکن است جذب ویتامین ب۱۲ را کاهش داده و منجر به کمبود این ویتامین در بدن گردد.

مصرف همزمان اس امپرازول با داروهای دیگر:

از داروهای نسخه‌ای، بدون نسخه، مکمل‌ها و ترکیبات گیاهی که در حال حاضر مصرف می‌کنید و یا اخیراً مصرف کرده‌اید، لیستی تهیه کنید و به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. اس‌امپرازول و داروهایی که در ادامه آورده شده ممکن است اثربخشی یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهند، از جمله:

- در صورتی که از داروی دیگری حاوی نلفیناویر استفاده می‌کنید از مصرف اس‌امپرازول بپرهیزید

- سایر داروهای تداخل کننده: آتازاناویر، کتوکونازول، ایتراکونازول یا وریکونازول، ارلوتینیب، سیتالوپرام، ایمی پرامین یا کلومی پرامین، دیازپام، فنی‌توئین، وارفارین، سیلوستازول، کلوپیدوگرل، دیگوکسین، تاکرولیموس، متوترکسات، ریفامپین، گل‌راعی

مصرف در دوران بارداری:

اگر در دوران بارداری هستید یا قصد بارداری دارید، قبل از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

مصرف در دوران شیردهی:

اطلاعاتی از ترشح اس‌امپرازول در شیر موجود نیست، بنابراین از مصرف آن در شیردهی بپرهیزید.

رانندگی و کار با ماشین‌آلات:

اس‌امپرازول ممکن است باعث عوارضی مانند سرگیجه و تاری دید شود. در صورت بروز این علائم، از رانندگی و کار با ماشین‌آلات خودداری کنید.

۳. نحوه و مقدار مصرف اس‌امپرازول:

نحوه مصرف:

دارو را مطابق با دستور پزشک یا داروساز مصرف نمایید و از کاهش و یا افزایش میزان مصرف و یا طول دوره درمان بدون مشورت با پزشک یا داروساز خودداری نمایید. رعایت این اصول منجر به دستیابی به بهترین نتایج درمانی و کاهش عوارض جانبی دارو می‌گردد.

استفاده از اس‌امپرازول در سنین کمتر از ۱۲ سال پیشنهاد نمی‌گردد.

ترجیحاً نیم ساعت قبل از صبحانه مصرف شود.

کپسول‌ها را به صورت کامل همراه با آب میل کنید. از جویدن یا خرد کردن کپسول خودداری کنید، زیرا پلت‌ها دارای روکشی است که از تخریب دارو توسط اسید معده جلوگیری می‌کنند و افرادی که مشکل در بلع کپسول دارند می‌توانند آن را باز کرده و در نصف لیوان آب بدون کربنات

مخلوط کرده و مصرف کنند.

در صورتی که اسامپرازول را بیش از مقدار توصیه شده مصرف کردید:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، فوراً با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید:

در صورت فراموش نمودن یک نوبت از مصرف دارو، به محض یادآوری، آن را مصرف نمایید. در صورتی که نزدیک زمان مصرف نوبت بعدی می‌باشد؛ نوبت فراموش شده را مصرف نکنید. از دو برابر کردن مقدار مصرف نوبت بعدی برای جبران نوبت فراموش شده، خودداری کنید.

۴. عوارض جانبی احتمالی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود اما در صورت بروز این عوارض در اسرع وقت با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

در صورت ابتلا به هریک از عوارض زیر، مصرف اسامپرازول را قطع کرده و بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض نادر (کمتر از ۱/۱۰ درصد):

زرد شدن پوست، تیره شدن ادرار و احساس خستگی که می‌تواند نشانه‌های اختلالات کبدی که به ندرت ممکن است بروز کند.

خس‌خس سینه ناگهانی، تورم لب‌ها، زبان، حلق و کل بدن، راش پوستی، از حال رفتن و اختلال بلع (علائم واکنش های آلرژیک شدید).

عوارض جانبی غیر شایع:

استفاده مداوم از مهارکننده‌های پمپ پروتون مانند اسامپرازول بیش از یک سال، خطر بروز شکستگی در ناحیه لگن، مچ و ستون فقرات را افزایش می‌دهد. در صورتی که سابقه ابتلا به پوکی استخوان یا مصرف کورتیکواستروئیدها را دارید به پزشک خود اطلاع دهید.

سایر عوارض جانبی:

عوارض جانبی شایع (۱-۱۰٪):

سردرد، اسهال، درد شکمی، یبوست، نفخ، حالت تهوع، استفراغ، پولیپ‌های خوش خیم معده.

عوارض جانبی غیر شایع (۱-۱۰٪):

تورم پاها و مچ پا، بی‌خوابی، احساس سوزن سوزن شدن انگشتان، احساس خواب‌آلودگی، سرگیجه، خشکی دهان، تغییر در آزمایشات خونی که چگونگی عملکرد کبد را کنترل می‌کند، راش پوستی، کهیر، خارش پوست.

۵. شرایط نگهداری

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را تا زمان مصرف درون بسته‌بندی اصلی نگهداری کنید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

منابع:

1. BNF 80, September 2020- March 2021, pp. 84-83
2. <https://www.medicines.org.uk/emc/product/2611/pil>, last updated on emc: 4 Sep2022

