

مایوکر®

بتانکول کلراید

قرص ۱۰ و ۲۵ میلی گرم

قبل از مصرف دارو لطفاً تمام بروشور را به دقت مطالعه فرمایید. این دارو فقط برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ بنابراین از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری فرمایید.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفاً با پزشک معالج یا داروساز خود تماس حاصل فرمایید.

در صورت تشدید عوارض جانبی و یا داشتن هر گونه عارضه جانبی که در این بروشور ذکر نشده است لطفاً با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

۱. مایوکر چیست و برای چه مواردی مصرف می شود؟

مایوکر حاوی ماده موثره بتانکول، با تحریک مثانه به تخلیه‌ی ادرار کمک می‌کند. این دارو برای درمان احتباس ادراری غیر انسدادی (مشکل در دفع ادرار) که معمولاً بعد از جراحی، زایمان و سایر موارد مشابه رخ می‌دهد، به کار می‌رود.

احتباس ادراری در اثر آسیب مغز، طناب عصبی (نخاع) و یا آسیب عصب هم ممکن است رخ دهد. این آسیب عصب ممکن است به دنبال بیماری ام اس (MS)، پارکینسون، دیابت، عفونت مغز یا نخاع، مسمومیت با فلزات سنگین، سکته، آسیب نخاع یا جراحی لگن ایجاد شود. این دارو ممکن است علاوه بر موارد گفته شده، کاربردهای دیگری هم داشته باشد.

۲. اطلاعاتی که لازم است قبل از شروع مصرف بتانکول بدانید:

- در صورت وجود موارد زیر بتانکول را مصرف نکنید:
- حساسیت به بتانکول یا سایر ترکیبات به کار رفته در فراورده.
- ابتلا به پرکاری تیروئید کنترل نشده، بیماری زخم معده، صرع، آسم، کندی شدید ضربان قلب یا افت شدید فشار خون، گُر

گرفتگی، بیماری عروق کرونر، اختلال پارکینسون، انسداد مکانیکی دستگاه گوارش یا دستگاه ادراری، افراد مشکوک به انسداد آناتومیک دستگاه گوارش یا دستگاه ادراری، مواردی که حرکات ماهیچه دستگاه گوارشی یا مثانه دچار اختلال است (از جمله بعد از جراحی مثانه، جراحی برداشتن بخشی از دستگاه گوارش، احتمال وجود انسداد گوارشی)، انسداد دهانه مثانه، اختلال اسپاسم دستگاه گوارش، زخمهای التهابی حاد دستگاه گوارش، التهاب پرده صفاق و تحریک عصب واگ (علائم: افت فشار خون، افت ضربان قلب، تنگی عنبیه، سردی دست و پا، عرق سرد، خستگی شدید و در موارد نادر سنکوب وابسته به عصب واگ).

موارد احتیاط

در صورت وجود موارد زیر قبل از شروع مصرف بتانکول با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

- عفونت ناشی از رفلاکس ادراری:

در بیماران مبتلا به دفع باکتری از طریق ادرار، اگر با انقباض مثانه در اثر مصرف بتانکول، دریچه شل نشود، احتمال عفونت رفلاکس وجود دارد. در عفونت رفلاکس به جای خروج طبیعی ادرار از دریچه مثانه به مجاری پایین‌تر، بازگشت به مجاری بالاتر رخ می‌دهد.

- رفلاکس گوارشی در کودکان:

مصرف بتانکول به عنوان یک افزایش دهنده حرکات دستگاه گوارش، برای درمان GERD (بازگشت محتویات معده به مری) در نوزادان و کودکان رایج بوده است. البته امروزه، به علت نسبت اثرات جانبی بیشتر به فواید بتانکول و اثربخشی آن، در بیماری GERD، تجویز نمی‌شود.

- مصرف این دارو ممکن است باعث احساس سرگیجه و از حال رفتن، به خصوص زمانی که می‌خواهید از حالت خوابیده یا نشسته بلند شوید، گردد. برای پیشگیری از سرگیجه، افتادن و آسیب به خود، به آرامی تغییر وضعیت دهید و بلند شوید.

- مصرف بتانکول همراه با سایر داروها:

از داروهای نسخه‌ای، بدون نسخه، مکمل‌ها و ترکیبات گیاهی که در حال حاضر و یا اخیراً مصرف کرده‌اید، لیستی تهیه کنید و به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. بتانکول و این داروها ممکن است بر پاسخ درمانی یا عوارض جانبی هم اثر بگذارند:

مهارکننده‌های استیل کولین استراز، بتا بلاکرها و داروهای موثر بر کیسه صفرا، که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

آتروپین، دنپزیل، تاکرین، کینیدین، پروکابین‌آمید، ریواستیگمین، گالانتامین، هوپریزن‌آ، فیزوستیگمین، پیریدوستیگمین، سیمتروپیوم، سینکالید، پروپرانولول، متوپرولول، بیزوپرولول و آتنولول.

مصرف بتانکول در دوران بارداری:

مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی‌شود و تنها با نظر پزشک و با در نظر داشتن فواید در برابر خطرات احتمالی آن صورت گیرد.

مصرف بتانکول در دوران شیردهی:

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود؛ ترشح این دارو

در شیر مشخص نشده است. با احتمال بروز عوارض جانبی بتانکول در نوزاد شیرخوار و در نظر گرفتن نیاز مادر به درمان با این دارو، باید تصمیم گرفته شود که مصرف دارو یا شیردهی قطع شود.

- رانندگی و کار با ماشین‌آلات:

این دارو می‌تواند میزان هوشیاری شما را در زمان رانندگی و یا کار با ماشین‌آلات، کاهش دهد. در صورتی که با مصرف بتانکول احساس گیجی یا کاهش سطح هوشیاری را تجربه کردید، از رانندگی و انجام فعالیت‌هایی که نیاز به هوشیاری دارند بپرهیزید.

۳. نحوه و مقدار مصرف:

- مقدار مصرف در کودکان:

- ۱۳/۰ تا ۶/۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز، که در ۳ تا ۴ بار در روز تقسیم شود. برای کودکان بیشترین مقدار مصرف در هر نوبت ۱۰ میلی‌گرم است.

- مقدار مصرف در بزرگسالان و سالمندان:

درمان با ۵ تا ۱۰ میلی‌گرم، سه تا چهار بار در روز شروع شده، مقدار مصرف این دارو را هر ساعت تا حداکثر ۵۰ میلی‌گرم در هر بار مصرف افزایش می‌دهند تا پاسخ درمانی موثر ایجاد شود.

- نحوه مصرف:

این دارو را یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا مصرف کنید. مصرف این دارو بلافاصله بعد از غذا ممکن است باعث ایجاد تهوع و استفراغ شود.

- در صورتی که بتانکول را بیش از مقدار توصیه شده مصرف کردید:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، فوراً با مراکز اورژانس و پزشک تماس بگیرید. علائم شناخته شده از مصرف بیش از اندازه این دارو عبارتند از: نیاز ناگهانی به دفع ادرار، دفع بی اختیار ادرار و مدفوع، کاهش فشار خون، اختلال در عملکرد قلب، تظاهرات آسم، عوارض گوارشی، افزایش ترشح بزاق، گرگرفتگی و احساس بالا رفتن دمای بدن، تعریق بیش از حد، تهوع و استفراغ.

- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید:

در صورتی فراموش کردن یک نوبت از دارو، به محض به یادآوردن آن را مصرف کنید. اما اگر نزدیک زمان نوبت بعدی دارو رسیده، از دو برابر کردن مقدار دارو برای جبران نوبت فراموش شده، خودداری کنید. برای نوبت بعدی همان مقدار معمول دارو را طبق برنامه مصرف کنید.

۴. عوارض جانبی احتمالی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

در صورت بروز علائم ازدیاد حساسیت و آلرژی از جمله راش پوستی، خارش، قرمزی، تورم، تاول، پوسته پوسته شدن همراه یا بدون تب، و زوز گوش، احساس تنگی نفس، اختلال در بلع، صحبت

کردن، التهاب دهان، صورت، لب‌ها، زبان یا گلو فوراً به پزشک یا اورژانس مراجعه کنید.

در صورت بروز یا تشدید هر یک از عوارض جانبی زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

گر گرفتگی، افت فشار خون، افزایش ضربان قلب، کولیک، سردرد، احساس ناخوشی، تشنج، تعریق بیش از حد، درد شکم، صدای حرکت روده‌ها، اسهال، خروج باد از گلو، تهوع، افزایش ترشح بزاق، استفراغ، تخلیه ادرار اورژانسی، افزایش ترشح اشک، تنگی مردمک چشم، آسم و تنگی نفس، و تنگی مجاری تنفسی.

۵. شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.
- دارو را در بسته‌بندی اصلی نگهداری کنید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

منابع:

1. ASHP. Standardize 4 Safety Initiative Compounded Oral Liquid Version 1.01. July 2017.
<https://www.ashp.org/-/media/assets/pharmacy-practice/s4s/docs/s4s-ashp-oral-compound-liquids.ashx?la=en&hash=4C2E4F370B665C028981B61F6210335AD5D0D1D6>.
2. Urecholine (bethanechol) [prescribing information]. North Wales, PA: Teva Pharmaceuticals USA; September 2015.
3. <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?sctid=5513ddc90-8c5-8188-4548-8a807465c>

