

يوريهانس® ٤٪ ملغم

تامسولوسين "رهش" المستمرة

كبسولة "رهش" المستمرة

أقراص يوريهانس® ٤٪ ملغ ممتدة الإفراز

تامسولوسين هييدروكلوريد

• اقرأ كل هذه النشرة بعناية قبل أن تبدأ في استخدام هذا الدواء.

• احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى قرأتها مرة أخرى.

• إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو الصيدلي أو الممرض.

• لقد تم وصف هذا الدواء لك فقط. لا تمرره للآخرين.

• إذا واجهت أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي.

١. ما هو يوريهانس® وما هي استخداماته:

• المكون النشط في يوريهانس® ٤٪ ملغ هو تامسولوسين، وهو مضاد انتقائي لمستقبلات a₁A/1D-أدريناлиنية. يقلل من توتر العضلات الملساء في البروستاتا والإحليل، مما يسهل مرور البول عبر الإحليل ويساعد على التبول. بالإضافة إلى ذلك، يقلل من إحساس الحاجة.

• يُستخدم يوريهانس® ٤mg في الرجال لعلاج الشكاوى المتعلقة بالجهاز البولي السفلي المرتبطة بتضخم الغدة البروستاتية الحميد. قد تشمل هذه الشكاوى صعوبة التبول (تدفق ضعيف)، التقطير، الإلحاچ وال الحاجة للتبول بشكل متكرر في الليل وكذلك خلال النهار.

٢. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام يوريهانس®:

- لا تستخدم يوريهانس® إذا:
- كنت تعاني من حساسية (فرط حساسية) تجاه التامسولوسين أو أي من المكونات الأخرى في يوريهانس®/٤٠ ملغ. قد تظهر فرط الحساسية على شكل تورم محلي مفاجئ في الأنسجة الرخوة في الجسم (مثل الحلق أو اللسان)، صعوبة في التنفس و / أو حكة وطفح جلدي (وذمة وعائية).
- كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الكبد.
- تعاني من الإغماء بسبب انخفاض ضغط الدم عند تغيير الوضع (الجلوس أو الوقوف).
- تحدث إلى طبيبك أو صيدليتك قبل استخدام يوريهانس®:
- عند الاستخدام طويل الأمد لهذا المنتج، من الضروري إجراء فحوصات طبية منتظمة.
- نادراً ما تم الإبلاغ عن انخفاض في ضغط الدم أثناء استخدام كبسولات تامسولوسين. عند الشعور الأول بالدوار، من الضروري الجلوس أو الاستلقاء حتى تختفي هذه العلامات.
- إذا كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الكلى، أخبر طبيبك.
- إذا كنت تخضع لجراحة في العين (جراحة الساد أو الزرق) أو تم تحديد موعد لها، يرجى إبلاغ طبيبك أنك تتناول أو تناولت مؤخراً كبسولات تامسولوسين. يمكن للأخصائي اتخاذ الاحتياطات المناسبة فيما يتعلق بالأدوية والتقنيات الجراحية التي سيتم استخدامها.
- **الأطفال والمراهقون:**
لا تعطي هذا الدواء للأطفال أو المراهقين دون سن ١٨ عاماً لأنه لا يعمل في هذه الفئة.

٣. أدوية أخرى ويوريهانس®:

- أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أو قد تتناول أي أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية العشبية أو الأدوية الأخرى التي تم شراؤها بدون وصفة طبية.
- قد يؤدي تناول يوريهانس®/٤٠ ملغ مع أدوية أخرى من نفس الفئة (مضادات مستقبلات ألفا ١ الأدرينالية) إلى انخفاض غير مرغوب فيه في ضغط الدم، مما يسبب الدوخة أو الشعور بالدوار.
- الأدوية التي قد تقلل من إزالة كبسولات التامسولوسين من الجسم (على سبيل المثال، الكيتوكونازول، الإريثروميسين).
- الأدوية التي قد تسرع من إزالة التامسولوسين من الجسم، مما يؤدي إلى تقصير مدة فعالية التامسولوسين (على سبيل المثال، الديكلوفيناك، الوارفارين).

٤. الحمل، الرضاعة الطبيعية والخصوصية:

- لا يُشار إلى استخدام تامسولوسين لدى النساء.
- في الرجال، تم الإبلاغ عن اضطرابات القذف المرتبطة باستخدام تامسولوسين.

٥. القيادة والعمل مع الآلات:

يمكن أن يحدث دوار أثناء العلاج؛ في هذه الحالة يجب عدم القيام بأنشطة تتطلب الانتباه.

٦. كيفية تناول يوريهانس®:

الجرعة الموصى بها هي كبسولة واحدة يومياً تؤخذ بعد الإفطار أو الوجبة الأولى من كل يوم. يجب بلع الكبسولة كاملة وعدم مضغها أو سحقها.

إذا تناولت أكثر من يوريهانس® مما ينبغي:

قد يؤدي تناول الكثير من يوريهانس® مبلغ $\frac{1}{4}$ ملء إلى انخفاض غير مرغوب فيه في ضغط الدم وزيادة في معدل ضربات القلب، مع شعور بالدوار. اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت قد تناولت جرعة زائدة من يوريهانس® مبلغ $\frac{1}{4}$ ملء.

إذا نسيت تناول جرعة واحدة من يوريهانس®:

يمكنك تناول جرعة يوريهانس® اليومية $\frac{1}{4}$ ملء في وقت لاحق من نفس اليوم إذا كنت قد نسيت تناولها كما هو موصى به. إذا فاتتك يوم، فقط استمر في تناول الكبسولة اليومية كما هو موصوف. لا تتناول جرعة مزدوجة لتعويض الكبسولة المنسية.

لا تتوقف عن تناول يوريهانس® دون استشارة:

لا تتوقف عن تناوله دون استشارة طبية من طبيبك.

٧. الآثار الجانبية المحتملة:

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثراً جانبية، على الرغم من أن ليس الجميع يعاني منها.

تحدث إلى طبيب على الفور إذا:

حدث دوار أو ضعف، من الضروري الجلوس أو الاستلقاء حتى تختفي هذه العلامات.

توقف عن استخدام هذا المنتج واطلب المساعدة الطبية الفورية إذا حصلت على:

- رد فعل تحسسي مع بقع أو رقع بنفسجية على الجلد، بثور على الجلد، تقرش الجلد، (حمى) مرتفعة، ألم في المفاصل و/أو التهاب في العين (متلازمة ستيفن-جانسن).

- رد فعل تحسسي خطير يسبب تورم الوجه أو الحلق (وذمة وعائية).

آثار جانبية أخرى:
شائعة جداً وشائعة:

دوار (خصوصاً عند الانتقال من الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف)،
اضطراب القذف (اضطراب القذف)

غير شائع:

صداع، خفقان (نبض القلب أسرع من المعتاد ويكون ملحوظاً أيضاً)، انخفاض ضغط الدم مثلاً عند النهوض بسرعة من وضعية الجلوس أو الاستلقاء أحياً مرتبطاً بالدوار؛ سيلان أو انسداد الأنف (التهاب الأنف)، إسهال، شعور بالغثيان والتقيؤ، إمساك، ضعف (وهن)، طفح جلدي، حكة وشرى (أرتكاريا).

هذه ليست جميع الآثار الجانبية للتامسولوسين. إذا أصبحت أي من الآثار الجانبية خطيرة، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، يرجى إخبار طبيبك أو الصيدلي.

٨. كيفية تخزين يوريهانس® :

- ابق هذا الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العلبة بعد EXP.
- خزنه في درجة حرارة أقل من ٣٥°C مئوية.

مراجع:

https://www.astellas.com/gr/en/system/files/2019-08/EN_PIL%20Omnic.pdf

<https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.9245.pdf>

<https://www.medicines.org.uk/emc/product/9245/pil#about-medicine>

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2005/020579s016lbl.pdf