

ولاتریکس® ۵۰۰

قرص روکش دار خط دار

لووفلوکساسین

قبل از شروع مصرف دارو، مطالب برگه راهنما را به دقت مطالعه کنید. این دارو فقط برای شرایط فعلی شما تجویز شده است؛ بنابراین از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری فرمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفاً با پزشک معالج و یا داروساز خود تماس حاصل فرمایید.

در صورت تشدید عوارض جانبی و یا داشتن هرگونه عارضه جانبی که در این برگه راهنما ذکر نشده است، لطفاً با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

۱. لووفلوکساسین چیست و برای چه مواردی استفاده می‌شود؟

لووفلوکساسین نوعی آنتی‌بیوتیک است که برای درمان عفونت باکتریایی در نواحی زیر به کار می‌رود:

سینوس‌ها، ریه (در افراد مبتلا به پنومونیا یا افرادی که مشکلات تنفسی طولانی مدت دارند)، مجاری ادراری (شامل کلیه‌ها یا مثانه)، غده پروستات، پوست و بافت نرم (از جمله عضلات).

در برخی شرایط خاص ممکن است لووفلوکساسین برای کاهش احتمال ابتلا به آنتراکس تنفسی یا بدتر شدن بیماری پس از قرار گرفتن در معرض باکتری‌های عامل سیاه زخم استفاده شود.

۲. اطلاعاتی که لازم است قبل از شروع مصرف لووفلوکساسین بدانید:

در صورت وجود موارد زیر از مصرف لووفلوکساسین خودداری کرده و پزشک خود را مطلع سازید:

- سابقه حساسیت به لووفلوکساسین و دیگر آنتی‌بیوتیک‌های کینولونی
- مانند موکسی‌فلوکساسین، سیپروفلوکساسین یا افلوکساسین و یا سایر ترکیبات به کار رفته در این فراورده، علائم واکنش حساسیتی شامل: راش پوستی، مشکل در بلع یا مشکلات تنفسی، تورم لب‌ها، صورت، گلو یا زبان.
- اگر بینایی شما ضعیف شده است یا به نظر می‌رسد چشم‌ها شما تحت تأثیر قرار گرفته است، سریعاً با یک چشم‌پزشک مشورت کنید.
- سابقه ابتلا به صرع
- اگر تابحال دچار مشکل در تاندون‌های خود مانند تاندونیت مربوط به درمان با آنتی‌بیوتیک کینولونی شده‌اید.
- اگر کودک یا نوجوان در حال رشد هستید
- اگر باردار یا دوران شیردهی هستید و یا قصد بارداری دارید

هشدارها و موارد احتیاط

- قبل از مصرف لووفلوکساسین، در صورت وجود موارد زیر پزشک خود را مطلع سازید:
- اگر ۶۰ سال یا بیشتر دارید
- اگر کورتیکواستروئید مصرف می‌کنید
- سابقه تشنج
- سابقه آسیب مغزی از جمله سکته مغزی
- مشکلات کبدی و یا کلیوی
- بیماری فلوئسم
- سابقه مشکلات روحی
- سابقه مشکلات قلبی از جمله طولانی بودن فاصله QT، کندی ریتم قلب، نارسایی قلب و یا سکته قلبی
- بزرگی شش‌های رگ‌های خونی یا آنوریسم آئورت
- سابقه پارگی آئورت
- نارسایی دریچه‌های قلب
- بیماری دیابت
- بیماری میاستنی گراویس
- در صورت بروز هر یک از موارد زیر طی دوره درمان با لووفلوکساسین در اسرع وقت با پزشک خود تماس بگیرید:
- اگر به طور ناگهانی احساس درد شدید در شکم، قفسه سینه یا پشت داشتید.
- اگر به طور ناگهانی دچار تنگی نفس (به خصوص هنگام دراز کشیدن)، تورم در مچ پاها، پاها یا شکم و یا تپش قلب شدید.
- واکنش‌های حساسیتی پوستی گسترده همراه با تاول و جدا شدن پوست، به خصوص در اطراف دهان، بینی، چشم‌ها و اندام تناسلی که با تب و علائم آنفولانزا همراه باشد (که می‌تواند مطرح کننده سندرم استیونز-جانسون و نکرولیز اپیدرمال سمی باشد).
- علائم شبه آنفولانزا، قرمزی پوست صورت، افزایش دمای بدن، افزایش

آنزیم‌های کبدی، افزایش نوعی از گلبول‌های سفید خون (اوتوزینوفیلی) و بزرگ شدن غدد لنفاوی.

• مصرف لووفلوکساسین ممکن است سبب درد و تورم مفاصل و التهاب یا پارگی تاندون‌ها شود. احتمال بروز این عارضه در افراد بالای ۶۰ سال، افرادی که سابقه پیوند عضو، مشکل کلیوی یا دریافت کورتیکواستروئید داشته‌اند بیشتر خواهد بود.

مصرف لووفلوکساسین همراه با سایر داروها

از داروهای نسخه‌ای، بدون نسخه، مکمل‌ها و ترکیبات گیاهی که در حال حاضر و یا اخیراً مصرف کرده‌اید، لیستی تهیه کنید و به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. لووفلوکساسین ممکن است اثربخشی داروهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهد از جمله داروهایی مانند کورتیکواستروئیدها، وارفارین، تتوفیلین، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAID)، سیکلوسپورین، داروهای ضدآریتمی (مانند کینیدین، هیدروکینیدین، سوتالول و آمیودارون)، داروهای ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای مانند آمی‌تریپتیلین و ایمپرامین)، داروهای ضد جنون و دسته آنتی‌بیوتیکی ماکرولیدها (مانند اریترومايسين، آزیترومايسين و کلاریترومايسين)، پروبنسید و سایمتیدین از مصرف همزمان لووفلوکساسین با داروهای زیر خودداری کنید زیرا سبب کاهش اثر درمانی لووفلوکساسین می‌شوند:

قرص آهن، مکمل زینک، منیزیم یا آنتی‌اسیدهای حاوی آلومینیوم، دیدانوزین یا سوکرالفیت. زمان مصرف این داروها بایستی حداقل ۲ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از مصرف لووفلوکساسین باشد.

تست ادرار مواد اپیوئیدی

تست ادرار برای تشخیص اپیوئیدها ممکن است در افرادی که از قرص لووفلوکساسین استفاده می‌کنند به صورت کاذب مثبت نشان داده شود.

تست توبرکلوزیس

استفاده از لووفلوکساسین ممکن است تست آزمایشگاهی باکتری مولد سل یا توبرکلوزیس را به طور کاذب منفی نشان دهد.

بارداری و شیردهی

این دارو نباید در دوران بارداری و شیردهی مصرف شود؛ اگر در دوران بارداری و شیردهی هستید یا قصد بارداری دارید، قبل از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

رانندگی و کار با ماشین‌آلات

ممکن است شما با مصرف این دارو دچار گیجی، خواب‌آلودگی، سرگیجه و تغییر در بینایی شوید و توانایی شما در تمرکز و واکنش سریع تحت تاثیر قرار بگیرد. در این صورت از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به تمرکز بالا دارند بپرهیزید.

۳. مقدار و روش مصرف لووفلوکساسین

مقدار مصرف دارو

دارو را مطابق با دستور پزشک مصرف نمایید و از کاهش و یا افزایش میزان مصرف و یا طول دوره درمان بدون مشورت با پزشک خودداری نمایید. رعایت این اصول منجر به دستیابی به بهترین نتایج درمانی و کاهش عوارض جانبی دارو می‌گردد.

دوز معمول مورد استفاده از لووفلوکساسین در بالغین با عملکرد طبیعی کبد و کلیه برحسب نوع و شدت عفونت بین ۲۵۰ تا ۷۵۰ میلی‌گرم هر ۲۴ ساعت است.

دوز مصرفی برای بزرگسالان دچار مشکلات کبدی بایستی توسط پزشک کاهش یابد.

نحوه مصرف

قرص لووفلوکساسین را می‌توان بدون توجه به وعده‌های غذایی استفاده کرد. قرص را همراه با آب مصرف کرده و در طول روز مقدار زیادی آب بنوشید. مصرف این دارو با آب پرتقال می‌تواند سبب کاهش جذب دارو شود.

در صورت نیاز به دریافت مکمل‌های آهن، زینک، منیزیم، سوکرافیت و سوسپانسیون‌های ضد اسید از مصرف همزمان این داروها با لووفلوکساسین پرهیزید و حداقل ۲ ساعت بین دریافت این داروها با لووفلوکساسین فاصله زمانی ایجاد کنید.

تا دو روز پس از اتمام درمان با این دارو با استفاده از کرم ضد آفتاب و پوشش پوست با لباس و کلاه از آسیب دیدن پوست خود جلوگیری نمایید.

در صورتی که لووفلوکساسین را بیش از مقدار توصیه شده مصرف کرده‌اید:

در صورتی که اشتباهاً بیش از مقدار تجویز شده از دارو استفاده کردید فوراً به پزشک مراجعه کنید. ممکن است در صورت مصرف بیش از حد لووفلوکساسین موارد زیر بروز کنند: تشنج، احساس گیجی، سرگیجه، کاهش سطح هوشیاری، لرزش و مشکلات قلبی (ضربان قلب نامنظم)، همراه با تهوع یا سوزش معده.

در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کرده‌اید:

در صورتی که فراموش کردید دارو را استفاده کنید، به محض یادآوری می‌توانید آن را مصرف کنید مگر اینکه به زمان دوز بعدی دارو نزدیک شده باشید. در این صورت، دوز جدید را در زمان مشخص خود استفاده کرده و از دوبرابر کردن دوز تجویزی به منظور جبران فراموشی، خودداری کنید.

در صورتی که مصرف دارو را خودسرانه قطع کرده‌اید:

تمامی دوزهای تجویز شده باید به طور کامل مصرف شوند و بیمار نباید در صورت احساس بهبودی دوره درمان را به صورت نیمه رها کند. در صورت قطع مصرف دارو پیش از موعد، ممکن است تکرار عفونت صورت بگیرد، وضعیت بیمار وخیم‌تر شود یا باکتری به درمان مقاوم گردد.

۴. عوارض جانبی احتمالی

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

در صورت بروز عوارض جانبی زیر، مصرف دارو را قطع کرده و به مراکز درمانی مراجعه کنید:

واکنش‌های آلرژیک (با علائمی نظیر راش، اختلال در بلع یا تنفس، تورم لب‌ها، صورت، گلو یا زبان)، اسهال آبکی که ممکن است همراه با دفع خون نیز باشد، کولیت، تاندونیت (التهاب یا درد تاندون‌ها)، تشنج، علائم نوروپاتی (مانند درد و سوزش و گزگز انگشتان)، راش‌های شدید پوستی همراه با پوست‌ریزی اطراف دهان و چشم‌ها، اختلالات شدید کبدی (با علائمی نظیر کاهش اشتها، زردی پوست و چشم‌ها، ادرار تیره رنگ، خارش، درد شکمی)

در صورت بروز هر یک از علائم زیر، پزشک خود را مطلع سازید:

عوارض جانبی شایع (با شیوع $\geq 10\%$):

اختلالات خواب، سردرد، سرگیجه، اسهال، تهوع، استفراغ، افزایش برخی فاکتورهای کبدی

عوارض ناشایع (با شیوع 1% تا 10%):

تغییر در تعداد باکتری‌ها یا قارچ‌های دیگر، عفونت قارچی به نام کاندیدا، که ممکن است نیاز به درمان داشته باشد، تغییر در تعداد برخی از انواع گلبول‌های سفید خون (لکوپنی، ائوزینوفیلی)، احساس استرس (اضطراب)، احساس گیجی، احساس عصبی بودن، خواب‌آلودگی، لرزیدن، احساس چرخش (سرگیجه)، تنگی‌تنفس (دیسپنه)، تغییر در طعم و مزه، از دست دادن اشتها، ناراحتی معده یا سوء هاضمه، درد در ناحیه معده، احساس نفخ یا یبوست، خارش و بثورات پوستی، خارش شدید یا کهیر، تعریق زیاد (هایپرهیدروز)، درد مفاصل یا درد عضلانی، نتایج غیرمعمول در آزمایش خون که ممکن است به دلیل مشکلات کبدی (بیلیروبین افزایش یافته) یا مشکلات کلیه (افزایش کراتینین) باشد، ضعف عمومی.

۵. شرایط نگهداری

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- دارو را تا زمان مصرف درون بسته‌بندی اصلی نگهداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از 30°C درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

منابع:

1. <https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.6129.pdf>. Access date: June 2022.
2. BNF 80, September 2020, P: 1236.
3. Levofloxacin FDA-label. Revised: September 2008

