

کابرنا[®] ۱

کابرگولین

قرص

قبل از شروع مصرف دارو مطالب بروشور را به دقت مطالعه کنید. این دارو فقط برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. بنابراین از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری فرمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفاً با پزشک معالج و یا داروساز خود تماس حاصل فرمایید. در صورت تشدید عوارض جانبی و یا داشتن هرگونه عارضه جانبی که در این بروشور ذکر نشده لطفاً با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

۱. کابرنا چیست و در چه مواردی قابل استفاده است:

این فرآورده حاوی ماده‌ی موثره‌ی کابرگولین می‌باشد. این دارو متعلق به گروهی از داروها به نام آگونیست‌های دوپامین می‌باشد. این دارو برای درمان علائم بیماری پارکینسون در بزرگسالان استفاده می‌شود. این دارو زمانی توسط پزشک تجویز می‌گردد که سایر داروهای درمان دوپامین موثر واقع نشده است.

۲. نکاتی که باید قبل از مصرف کابرگولین بدانید:

موارد منع مصرف

- حساسیت به کابرگولین یا سایر ترکیبات موجود در فرمولاسیون
- ابتلا به بیماری‌های فیبروتیک دریچه‌ی قلب (به این دلیل که دارو طولانی مدت مصرف خواهد شد)
- ابتلا به بیماری‌های دریچه‌ی قلب
- سابقه‌ی ابتلا به بیماری‌های فیبروز شکمی، ریوی و یا قلبی

موارد احتیاط

موارد زیر را پیش از شروع مصرف کابرگولین به پزشک یا داروساز خود

اطلاع دهید:

- بیماری‌های قلبی

- بیماری رینود

- مشکلات شدید قفسه‌ی سینه

- بیماری‌های کبدی

- زخم معده، یا خونریزی معده و روده

- بیماری ذهنی در برخی مشکلات روانی

- واکنش‌های فیبروتیک که روی قلب، ریه و شکم اثر گذار بوده است. در

صورت مصرف طولانی مدت کابرگولین، پزشک بررسی‌های قلبی، ریه، و

کلیه و خون درخواست خواهد کرد. اکوکاردیوگرافی انجام خواهد شد. اگر

فیبروز اتفاق بیفتد، دارو قطع می‌شود.

- افت فشار خون وضعیتی ممکن است در مصرف این دارو به خصوص

در روزهای ابتدایی مصرف دیده شود.

مصرف کابرگولین همراه با سایر داروها

از داروهای نسخه‌ای، بدون نسخه، مکملها و ترکیبات گیاهی که در حال

حاضر و یا اخیراً مصرف کرده‌اید، لیستی تهیه کنید و به پزشک یا

داروساز خود اطلاع دهید.

داروهای موثر در بیماری‌های ذهنی مانند فنوتیازین‌ها، تیوتیکسن،

بوتیروفنون‌ها

داروهای موثر بر تهوع و استفراغ مانند متوکلوپرامید

آنتی بیوتیک‌ها مانند اریترومیسین و داروهای موثر در میگرن مانند

ارگوتامین

بارداری و شیردهی

در زمان مصرف دارو باید از روش‌های موثر ضد بارداری استفاده نمود. در

صورت بارداری، یا شک به بارداری برای ادامه‌ی مصرف دارو با پزشک

مشورت کنید.

در زمان شیردهی نباید از این دارو استفاده شود زیرا که بر تولید شیر

موثر است. در صورت مصرف کابرگولین از روش‌های دیگر برای تغذیه

نوزاد استفاده نمایید.

رانندگی و کار با ماشین آلات

کابرگولین ممکن است حالت گیجی و خواب آلودگی ایجاد کند. حالت

خواب آلودگی ناگهانی ممکن است بدون هیچ گونه پیش درآمدی

اتفاق بیفتد. در صورت تجربه‌ی این علائم رانندگی نکنید و یا با

ماشین آلات کار نکنید.

۳. نحوه و مقدار مصرف کابرگولین

نحوه مصرف

همیشه دارو را همان گونه که پزشک دستور داده مصرف نمایید در صورت

عدم اطمینان از طرز صحیح مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت

کنید.

دوز معمول کابرگولین برای شروع ۱ میلی‌گرم در روز می‌باشد. بهتر است

دارو را بعد از غذا مصرف کنید تا عوارض گوارشی ناشی از آن کاهش

یابد. ممکن است پزشک دوز را تا کنترل علائم افزایش دهد.

کابرگولین باید یک بار در روز استفاده گردد و بیشتر از ۳ میلی گرم روزانه نباید استفاده گردد.

در صورتی که کابرگولین را بیش از مقدار توصیه شده دریافت کردید:

در صورت مصرف تعداد زیاد قرص کابرگولین، سریعاً با پزشک خود درمیان بگذارید و یا سریعاً به بیمارستان مراجعه نمایید. علائم مصرف دوز بالای دارو شامل تهوع، استفراغ، مشکلات معده، فشار خون پایین، گیجی و توهّم می باشد.

در صورتیکه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید:

در صورت فراموش کردن یک دوز، دارو را در سریع ترین زمان ممکن استفاده نمایید. هرگز دوز را دو برابر نکنید.

۴. عوارض جانبی احتمالی

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود.

در صورت وجود علائم زیر سریعاً با پزشک تماس بگیرید:

- بیماری های مرتبط با دریچه ی قلب مانند التهاب پری کارد و تجمع مایع اطراف قلب، علائم اولیه شامل تنفس سخت، تنگی نفس، تپش قلب، احساس غش، درد قفسه ی سینه، درد کمر، درد لگن، تورم پا.
- تغییر در رفتار مانند تمایل به قمار، افزایش میل جنسی، افزایش میل به خرید، و افزایش اشتها

عوارض با احتمال بروز بیشتر

تهوع، تورم مچ پا

عوارض با احتمال بروز کمتر

استفراغ، سوهاضمه، تورم معده، یبوست، حرکات خارج از اختیار اندام ها، کاهش فشار خون، اختلال در خواب، افزایش میل جنسی، گیجی

۵. شرایط نگهداری:

دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

داروی منقضی شده را استفاده نکنید.

دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

دارو را در بسته بندی اصلی و به دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

منابع:

<https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1074.pdf>